



## FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

### La culture de FEVE

ITCMI 2010


|                                                                                                                                         |                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | الفول             |  |
|                                                        | FEVE              |                                                                                    |
|                                                        | BEAN              |                                                                                    |
| <b>Nom botanique</b>                                                                                                                    | <i>Vicia faba</i> |                                                                                    |
| <b>Famille:</b>                                                                                                                         | <i>Fabacées</i>   |                                                                                    |
| Originaire du moyen Orient et du bassin méditerranéen, parmi les plus vieilles espèces introduites en agriculture (plus de 10 000 ans). |                   |                                                                                    |

## I - PLANTE

- Plante enrichissante, fixe l'azote grâce aux nodosités.
- Longévité moyenne de la graine: 5 à 6 ans.
- Germination : 6°C lui est nécessaire pour la levée.
- Dose de semis : 150 à 200 kg / ha
- Cycle végétatif : 120 jours.

## II - STADES PHENOLOGIQUES

- 09 : la jeune pousse perce la surface.  
10 : 02 feuilles écailleuses visibles.  
11 : premières feuilles étalées.  
15/35 : début de l'élongation de la tige principale.  
51 : apparition des boutons floraux.  
61 : les fleurs de la première grappe sont ouvertes.  
71 : début maturation des gousses.  
89 : maturation complète des gousses.



## III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Deseville, Aguadulce...

## IV - EXIGENCES

- Aime les sols argilo- calcaire ou argilo siliceux riche en humus.
- Température : 18 -22 °C résiste au froid jusqu'à -3°C.
- pH : 6 à 7
- Aime les sols humides.
- Salinités : plante tolérante 3,20 à 5,10 g / l (5 à 8 mmhos/cm<sup>-1</sup>).
- Résiste à la chaleur, exigeante en lumière plante des jours longs.

## V- ZONES DE PRODUCTION

Peut être cultivée dans toutes les régions d'Algérie, surtout pour sa tolérance à la salinité.

## VI - MISE EN LACE DE LA CULTURE

- ✚ Labour 20 – 30 cm.
- ✚ Disquage + hersage- rayonnage.

### 6.1 - SEMIS

La culture de fève est relativement facile, normalement elle cultivée pendant les mois frais et humides de l'année (septembre – mai).

Culture de primeur : octobre novembre décembre

Pour la semence : février début mars à mai.

**Densité : 80 000 à 120 000 plants / ha**

**Distances** : Entre lignes : 0,50 à 0,70 m

Entre plants : 0,15 à 0,20 m ou 0,40 à 0,50 m en poquet  
(2 à 3 graines / poquet)

**Profondeur** : 4 - 5 cm en sols lourds.

: 6- 7 cm en sols légers.

### 6.2 – TRAVAUX D'ENTRETIEN :

Un binage léger, 2 à 3 semaines après un buttage.

### 6.3 –ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, buttage, désherbage

### 6.4 - FERTILISATION

- ✚ **Fumure organique** : fumier bien décomposé 15 à 20 t / ha

- ✚ **Fumure minérale** : 20 unité de N / ha  
60 à 70 unités de P/ ha  
80 à 90 unités e K / ha



### 6.5 - IRRIGATION

Son enracinement bien développé lui permet de résister à des manques d'eau.

Les sols lourds à bonne rétention lui conviennent bien où la pluviométrie est de **450 à 600 mm**. L'irrigation est très bénéfique pour la culture.

## VII - PROTECTION SANITAIRE

**Mildiou** : Mancozebe

Soufre + cyproconazole.

**Mouche des fèves** : pulvérisation à la floraison : Malathion..

**Pucerons** →  
Méthomyl  
Lambda Cyalothrine.





← **Rouille**  
Metiram zinc  
Zirame

**Botrytis** →  
Dichlofluamide wp  
Manèbe wp



## VIII – RECOLTE

Manuelle chaque 3 à 5 jours (4 à 5 mois après les semis)

**Rendements 5 à 8 t / ha**

### FTV : LA CULTURE DE FEVE (1 HA)

**RDT : 150 QX/HA**

| Opérations                              | Main d’œuvre |                  |               | Matériel  |                  |               | Approvisionnement |                  |               | Total<br>DA |        |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|--------|
|                                         | Nbre<br>J    | Coût<br>unitaire | Montant<br>DA | Nbre<br>H | Coût<br>unitaire | Montant<br>DA | quantité          | Coût<br>unitaire | Montant<br>DA |             |        |
| I. Pépinière :                          |              |                  |               |           |                  |               |                   |                  |               |             |        |
| - Semence                               | -            | -                | -             | -         | -                | -             | 180 kg            | 50               | 9000          | 9000        |        |
| S/T                                     | -            | -                | -             | -         | -                | -             | -                 | -                | 9000          | 9000        |        |
| II. Travaux du sol                      |              |                  |               |           |                  |               |                   |                  |               |             |        |
| - Epandage du fumier<br>+ engrais       | 0,5          | 600              | 300           | 4         | 500              | 2000          | 15 T              | 1200             | 18000         | 20300       |        |
|                                         |              |                  |               |           |                  |               | 4 qx              | 6000             | 24000         | 24000       |        |
| - Labour                                | 1            | 600              | 600           | 8         | 500              | 4000          | -                 | -                |               | 4600        |        |
| - Disquage + hersage                    | 0,5          | 600              | 300           | 4         | 500              | 2000          | -                 | -                |               | 2300        |        |
| - Rayonnage                             | 0,5          | 600              | 300           | 4         | 500              | 2000          | -                 | -                |               | 2300        |        |
| S/T                                     | 2,5          | -                | 1500          | 20        | -                | 10000         | -                 | -                | 42000         | 53500       |        |
| III. Plantation et entretien :          |              |                  |               |           |                  |               |                   |                  |               |             |        |
| - Confection trous +                    | }            | 20               | 600           | 12000     | -                | -             |                   | -                | -             | 12000       |        |
| pré- irrigation<br>+plantation          |              |                  |               |           |                  |               |                   |                  |               |             |        |
| - Binage + désherbage<br>+ buttage      |              | 15               | 600           | 9000      | -                | -             |                   | -                | -             | 9000        |        |
| -Traitement +<br>Produits : fong+insect |              | 2                | 600           | 1200      | 8                | 500           | 4000              |                  | -             | 15000       | 20200  |
| S/T                                     |              | 37               | -             | 22200     | 8                | -             | 4000              | -                | -             | 15000       | 41200  |
| Récolte et transport :                  |              |                  |               |           |                  |               |                   |                  |               |             |        |
| - Récolte+transport                     |              | 20               | 600           | 12000     | 16               | 500           | 8000              | -                | -             |             | 23000  |
| S/T                                     |              | 20               | -             | 12000     | 16               | -             | 8000              | -                | -             |             | 23000  |
| Total Général                           |              | 64,5             | -             | 38700     | 44               | -             | 22000             | -                | -             | 66000       | 126700 |